

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, comprimés pelliculés
pseudoéphédrine chlorhydrate

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Ce médicament est disponible sans prescription médicale. Toutefois, vous devez toujours prendre Vasocedine pseudoephedrine avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que Vasocedine pseudoephedrine et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Vasocedine pseudoephedrine?
3. Comment prendre Vasocedine pseudoephedrine?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Vasocedine pseudoephedrine?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

Vasocedine pseudoephedrine est un médicament pour le traitement des symptômes de nez bouché en cas d'inflammation de la muqueuse nasale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE?

Ne prenez jamais Vasocedine pseudoephedrine

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la pseudoéphédrine chlorhydrate ou à l'un des autres composants contenus dans Vasocedine pseudoephedrine.
- Chez des enfants de moins de 12 ans.

- Si vous êtes traité par des inhibiteurs de la MAO (un groupe de médicaments utilisés dans la dépression) ou si vous en êtes traité au cours des 14 derniers jours.
- En cas d'hypertension grave, maladies touchant les artères coronaires ou troubles du rythme cardiaque.

Faites attention avec Vasocedine pseudoephedrine

- Si vous êtes traité par:
 - d'autres décongestionnants de la muqueuse du nez
 - des freinateurs d'appétit
 - des médicaments stimulants (psychostimulants) du type amphétamine
 - certains médicaments contre la dépression (antidépresseurs tricycliques)
 - des médicaments contre le diabète
 - des médicaments contre l'hypertension
- Il est recommandé de réduire la dose chez les patients âgés ou chez les personnes souffrant de graves troubles du foie ou de la fonction rénale.
- Chez les personnes souffrant:
 - d'agrandissement de la prostate (hypertrophie de la prostate)
 - d'hypertension
 - de la tension intraoculaire élevée (glaucome)
 - de diabète
 - d'une sécrétion exagérée de la glande thyroïde
 - de maladies du cœur et des vaisseaux sanguins
- Si vous développez une rougeur se généralisant à tout le corps, associée à des pustules et pouvant être accompagnée de fièvre, arrêtez de prendre Vasocedine pseudoephedrine et contactez immédiatement votre médecin. Voir rubrique « 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ».
- Une douleur abdominale soudaine ou des saignements par l'anus peuvent survenir avec Vasocedine pseudoephedrine, suite à une inflammation du côlon (colite ischémique). Si vous présentez ces symptômes gastro-intestinaux, arrêtez de prendre Vasocedine pseudoephedrine et contactez votre médecin ou demandez immédiatement un avis médical. Voir rubrique 4.
- Une réduction du flux sanguin vers votre nerf optique peut se produire avec Vasocedine pseudoephedrine. Si vous souffrez d'une perte soudaine de la vision, arrêtez de prendre Vasocedine pseudoephedrine et contactez votre médecin ou demandez une assistance médicale immédiatement. Voir rubrique 4.
- Si vous utilisez d'autres médicaments. Veuillez également lire la rubrique «Prise d'autres médicaments».

Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Vasocedine pseudoephedrine peut avoir une influence sur l'action antihypertensive de certains médicaments comme p.ex. la réserpine, le méthyldopa et les bêta-bloquants. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Il existe un risque d'augmentation de la tension artérielle, lorsque Vasocedine pseudoephedrine est utilisé en même temps que d'autres produits ayant une action décongestionnante, ou en même temps que des freinateurs d'appétit, des médicaments stimulants (psychostimulants) du type amphétamine, des médicaments contre l'hypertension, la furazolidone (un médicament contre les infections), certains antidépresseurs tricycliques et des inhibiteurs de la MAO (groupe de médicaments utilisés dans la dépression).

Avec les inhibiteurs MAO, le risque d'hypertension reste élevé 15 jours après l'arrêt de leur utilisation.

- Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez les médicaments suivants en même temps que Vasocedine pseudoephedrine:
 - des médicaments à base d'hydroxyde d'aluminium (certains médicaments contre l'acidité de l'estomac et la diarrhée)
 - la metformine (médicament qui réduit le taux de glucose sanguin)
 - la trazodone (médicament contre les dépressions)

Aliments et boissons

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

Vasocedine pseudoephedrine ne peut pas être utilisé pendant les trois premiers mois de la grossesse.

Allaitement

Vasocedine pseudoephedrine ne peut pas être utilisé pendant l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

La prise de Vasocedine pseudoephedrine n'a pas d'influence sur la conduite de véhicules ni sur l'utilisation de machines, sauf en cas de signes d'agitation ou de tremblement.

Informations importantes concernant certains composants de Vasocedine pseudoephedrine

Vasocedine pseudoephedrine contient du lactose. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Vasocedine pseudoephedrine contient du jaune-orangé S (E110) et du ponceau 4R (E124). Ces composants peuvent provoquer des réactions ressemblant à une allergie.

3. COMMENT PRENDRE VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE?

Respectez toujours la posologie indiquée par de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose habituelle est:

Adultes et enfants à partir de 12 ans: 1 comprimé par fois, 3 à 4 x par jour.

Maximum 4 comprimés par jour.

Prendre le comprimé avec un peu d'eau.

Ne pas croquer le comprimé.

Le traitement doit durer le moins longtemps possible. Arrêtez le traitement dès la disparition des symptômes. Ne pas utiliser Vasocedine pseudoephedrine pendant plus de 7 jours.

Si vous avez pris plus de Vasocedine pseudoephedrine que vous n'auriez dû

Si vous avez pris trop de Vasocedine pseudoephedrine, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

En cas de surdosage, les symptômes suivants peuvent se produire: insomnie, agitation, hallucinations, tremblements, états d'angoisse, convulsions, maux de tête, transpiration, nausées, vomissements, accélération des battements cardiaques, palpitations, troubles de l'émission d'urine, élargissement des pupilles et hypertension.

Si vous oubliez de prendre Vasocedine pseudoephedrine

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Vasocedine pseudoephedrine

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, Vasocedine pseudoephedrine peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets secondaires suivants peuvent se produire: insomnie, agitation, bouche sèche, nervosité, nausées, maux de tête, accélération des battements cardiaques, hypertension, perturbation du goût et troubles de l'émission d'urine.

Dans de très rares cas, des hallucinations, des convulsions et des réactions de la peau peuvent se produire.

Une fièvre soudaine, une rougeur de la peau ou de nombreuses petites pustules (symptômes possible de la pustulose exanthématique aiguë généralisée – PEAG) peuvent survenir dans les 2 premiers jours du traitement avec Vasocedine pseudoéphedrine. Voir rubrique « 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE ? ». (Fréquence indéterminée)

Arrêtez de prendre Vasocedine pseudoéphedrine si vous développez ces symptômes et contactez immédiatement votre médecin.

Inflammation du côlon due à un apport de sang insuffisant (colite ischémique). (Fréquence indéterminée)

Réduction du flux sanguin vers le nerf optique (neuropathie optique ischémique). (Fréquence indéterminée)

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A conserver à température ambiante (15°C - 25°C).

Ne pas utiliser Vasocedine pseudoéphedrine après la date de péremption mentionnée sur la boîte/la plaquette thermoformée après “EXP”. Les deux premiers chiffres indiquent le mois, les deux ou quatre derniers l'année. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

Que contient Vasocedine pseudoéphedrine

- La substance active est la pseudoéphédrine chlorhydrate 60 mg.
- Les autres composants sont cellactose - stéarate de magnésium - dioxyde de silice colloïdale. Enrobage: hydroxypropylméthylcellulose - cellulose microcristalline - hydroxypropylcellulose - polyéthylène glycol - silicate alumino-potassique - dioxyde de titane - oxyde de fer - ponceau 4R (E124) - jaune-orangé S (E110).

Qu'est-ce que Vasocedine pseudoéphedrine et contenu de l'emballage extérieur

Boîte de 6 ou 30 comprimés pelliculés dans une plaquette thermoformée.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A.

Rijksweg 9

B-2880 Bornem

Numéro d'autorisation de mise sur le marché: BE 210743

Boîte de 6 comprimés pelliculés: Délivrance libre.

Boîte de 30 comprimés pelliculés: Sur prescription médicale ou sur demande écrite.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 07/2020.